

教育部 102 學年度高級中學數學競賽

中投區複賽試題（二） 編號：_____

（時間一小時）

注意事項：

1. 本試卷共六題填充題，滿分為二十一分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、設 P 為拋物線 $x^2 = 4y + 4$ 之頂點， \overline{AB} 為此拋物線上不過 P 的一弦，
(5 分) 當 $\angle APB = 90^\circ$ ，求 $\triangle APB$ 之最小面積。

二、設 $x = 0.1234$, $y = 0.8766$, 求

(4 分)

$$\left(\sum_{i=0}^{20} C_i^{20+i} x^{21} y^i + \sum_{j=0}^{20} C_j^{20+j} y^{21} x^j - 2 \right)^{2013}.$$

三、設 $f(x)$ 和 $g(x)$ 皆為實係數二次多項式且首項係數都是 1，已知 $f^2(x)$ 除
(3 分) 以 $g(x)$ 的餘式為 $4x - 4$ ，而 $g^2(x)$ 除以 $f(x)$ 的餘式為 $-4x - 4$ ，求
 $f(x) + g(x)$ 。

四、若 $3^{20} - 2^{30} = a \cdot 10^n$ ，其中 $1 < a < 10$ ，且 n 為正整數，求 a 的整數部分。

(3 分) ($\log 2 \approx 0.3010$, $\log 3 \approx 0.4771$)


五、設函數 f 滿足：對所有的實數 $x \neq 0$ 恒有 $2f(x) + 5f(\frac{1}{x}) = x$ 。

(3 分) 試求 $f(2)$ 。

六、如右圖所示，直角三角形 ACF 中

(3 分) $\angle C = 90^\circ$, $\overline{CF} = 3$, 若 $\overline{BE} = \overline{EF} = 2$,


且 $\angle ABE = 90^\circ$ ，求 \overline{BF} 。



教育部 102 學年度高級中學數學競賽
中投區複賽試題（二）【解答】

一、 5 分	16	四、 3 分	2
二、 4 分	-1	五、 3 分	$-\frac{1}{14}$
三、 3 分	$2x^2 + 2$	六、 3 分	$2\sqrt{3}$

一、【解】



設 $\overrightarrow{PA} : x = m(y+1)$

$\because \overrightarrow{PA} \perp \overrightarrow{PB}, \therefore \overrightarrow{PB} : x = -\frac{1}{m}(y+1).$

$$\text{由 } \begin{cases} x = m(y+1) \\ x^2 = 4(y+1) \end{cases} \Rightarrow m^2(y+1)^2 = 4(y+1) \Rightarrow y+1=0 \text{ or } y+1=\frac{4}{m^2}$$

$$\therefore A\left(\frac{4}{m}, \frac{4}{m^2}-1\right)$$

$$\text{由 } \begin{cases} x = -\frac{1}{m}(y+1) \\ x^2 = 4(y+1) \end{cases} \Rightarrow x^2 = -4mx \Rightarrow x=0 \text{ or } x=-4m$$

$$\therefore B(-4m, 4m^2 - 1)$$

故 ΔAPB 之面積為 $\frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4m^2 - 1 & -4m & 1 \\ \frac{4}{m^2} - 1 & \frac{4}{m} & 1 \end{vmatrix}$ 的絕對值，即 $\frac{1}{2} \left| 16m + \frac{16}{m} \right| = 8 \left| m + \frac{1}{m} \right|$

$$\text{當 } m > 0, \frac{m + \frac{1}{m}}{2} \geq \sqrt{m \cdot \frac{1}{m}} \Rightarrow m + \frac{1}{m} \geq 2$$

$$\text{當 } m < 0, \frac{(-m) + (-\frac{1}{m})}{2} \geq \sqrt{(-m) \cdot (-\frac{1}{m})} \Rightarrow m + \frac{1}{m} \leq -2$$

$$\therefore \left| m + \frac{1}{m} \right| \geq 2 \Rightarrow 8 \left| m + \frac{1}{m} \right| \geq 16$$

故 ΔAPB 面積之最小值為 16

二、【解】

丟銅板 $m+n$ 次，假設每次丟擲出現正面的機率為 x ，出現反面的機率為 y ，其中

$$x+y=1. \quad \sum_{i=0}^{n-1} C_i^{m+i-1} x^m y^i \text{ 恰為在丟擲 } m+n \text{ 次銅板的過程中先出現 } m \text{ 次正面的機}$$

$$\text{率，} \sum_{j=0}^{m-1} C_j^{n+j-1} y^n x^j \text{ 恰為在丟擲 } m+n \text{ 次銅板的過程中先出現 } n \text{ 次反面的機率，而這}$$

兩個事件彼此為補集，所以其和為 1，也就是

$$\sum_{i=0}^{n-1} C_i^{m+i-1} x^m y^i + \sum_{j=0}^{m-1} C_j^{n+j-1} y^n x^j = 1.$$

$$\text{所以} \left(\sum_{i=0}^{n-1} C_i^{m+i-1} x^m y^i + \sum_{j=0}^{m-1} C_j^{n+j-1} y^n x^j - 2 \right)^{1001} = (1-2)^{1001} = -1.$$

三、【解】

因為 f 和 g 皆為二次且首項係數都是 1，所以它們滿足以下：

$$f(x) = g(x) + ax + b \cdots (1)$$

由此可得

$$\begin{aligned} f^2(x) &= [g(x) + ax + b]^2 \\ &= g(x)[g(x) + 2(ax+b)] + (ax+b)^2 \end{aligned}$$

又 $f^2(x)$ 除以 $g(x)$ 之餘式為 $4x-4$ ，因此

$$\begin{aligned}(ax+b)^2 &= a^2x^2 + 2abx + b^2 \\&= a^2g(x) + 4x - 4 \cdots (2)\end{aligned}$$

($\because g(x)$ 的首項係數為 1)

另一方面，

$$\begin{aligned}g^2(x) &= [f(x) - ax - b]^2 \\&= f(x)[f(x) - 2(ax + b)] + (ax + b)^2\end{aligned}$$

而 $g(x)$ 除以 $f(x)$ 的餘式為 $-4x - 4$ ，

即知

$$(ax + b)^2 = a^2f(x) - 4x - 4 \cdots (3)$$

($\because f(x)$ 的首項係數為 1)

由(2)(3)可得

$$f(x) = g(x) + \frac{8}{a^2}x$$

再由(1)可得 $b = 0$, $\frac{8}{a^2} = a$, $a = 2$.

代回(2), (3)得 $f(x) = x^2 + x + 1$, $g(x) = x^2 - x + 1$

四、【解】

因為 $\log 3^{20} = 20 \log 3 = 20 \cdot 0.4771 = 9.542$

又 $\log 32 = 5 \log 2 = 1.505$, $\log 40 = 1 + 2 \log 2 = 1.602$

所以 $3^{20} = b \cdot 10^8$, 其中 $32 < b < 40$.

另一方面，

$$\log 2^{30} = 30 \log 2 = 9.030$$

$$\log 12 = 2 \log 2 + \log 3 = 1.0791$$

所以 $2^{30} = c \cdot 10^8$, 其中 $10 < c < 12$

綜合以上，可知

$$3^{20} - 2^{30} = d \cdot 10^8, \text{ 其中 } d = b - c, 20 < d < 30$$

$$= a \cdot 10^9, \text{ 其中 } 2 < a < 3$$

故 $n = 9$, 而 a 的整數部分為 2.

五、【解】

$$\begin{cases} 2f(x) + 5f\left(\frac{1}{x}\right) = x \\ 2f\left(\frac{1}{x}\right) + 5f(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4f(x) + 10f\left(\frac{1}{x}\right) = 2x \\ 25f(x) + 10f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{5}{x} \end{cases}$$

$$21f(x) = \frac{5}{x} - 2x$$

$$f(x) = \frac{5-2x^2}{21x}$$

$$f(2) = \frac{5-8}{42} = -\frac{1}{14}$$

六、【解】

$\triangle BEF$ 為等腰三角形 $\Rightarrow \alpha = \beta$

$\overline{BE} \parallel \overline{CF} \Rightarrow \alpha = \gamma$

$\therefore \beta = \gamma$

過 E 點作 \overline{BF} 的垂線， $\triangle EFG \cong BFC$

$$\therefore \overline{EF} : \overline{GF} = \overline{BF} : \overline{CF} ; \overline{BE} : \frac{\overline{BF}}{2} = \overline{BF} : \overline{CF}$$

$$\Rightarrow \overline{BF}^2 = 2\overline{BE} \cdot \overline{CF} = 12$$

$$\overline{BF} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

